

レーザーシャワー タイトニング を受けられる方へ 説明・同意書

患者ID
フリカナ

患者氏名 様

当院で使用する米国キャンデラ社製 GentleMaxPro(ジェントルマックス プロ)は、厚生労働省の医療機器承認を取得したロングパルスアレキサンドライト・ネオジウムヤグレーザーです(販売名:長期減毛・色素性疾患用レーザー装置 GentleMAX Pro 承認番号:23000BZX00128000)。ネオジウムヤグレーザーは、深達度を利用してシャワーのようにレーザーを当てることで真皮に熱を与え繊維芽細胞を刺激しエラスチンとコラーゲンを生成させる治療です。エラスチンとコラーゲンが生成されるまで約2、3か月程度かかります。月に一回の治療を4、5回受けて頂くことで改善効果を得られるため、継続的な治療が必要です。

●治療が受けられない方

下記の病気や症状がある方、下記薬剤の使用中的の方は治療を受けられません。

- 光過敏症(1064nmの光に過敏) 単純ヘルペス1型、2型の活動病変
- 開放創や感染創 刺青の部位 治療部位の癌 2ヶ月以内の日焼け
- 真皮性の色素斑の部位 等

※妊娠中の方は安全性が確立されていません。医師にご相談ください。

●治療に注意が必要な方

下記の病気や症状がある方、下記薬剤を使用中的の方は医師の判断によって治療が受けられない場合があります。

- てんかん発作 ケロイド、癬痕体質 免疫抑制剤 ステロイド製剤
- 全身状態不良 糖尿病等の慢性疾患 フィラー注入部位
- 黒子の部位 抗凝固剤・鉄剤 イチョウ等のサプリメント

●治療前注意事項

【日焼けの禁止】

日焼けをした状態では熱傷を生じるリスクが高くなるため照射をすることができません。

日焼けをしないようSPF30以上の日焼け止めの使用等、日焼けを予防してください。

※日焼けしてしまった場合には、日焼けが落ち着いてからの照射となります。

【皮膚の清浄】

照射部位に日焼け止めや化粧品(クリーム、化粧水含む)が残っていると、レーザーが成分に反して熱傷を起こす可能性があります。照射前には必ず落としてください。

●治療中注意事項

- ・いつもと違った痛みやヒリヒリするなど違和感がある場合はお申し出ください。
- ・レーザーの光から目を保護するためにゴーグルをかけていただきます。ゴーグルをかけた状態でも目を閉じていてください。明るく感じることもありますが影響はありません。直接レーザー光をみないためにも照射中は絶対にゴーグルを外さないでください。

●治療後注意事項

- ・照射部位が赤く腫れることがあります。これは一過性の症状ですので1週間程度で軽快します。1週間以上経過しても軽快しない場合は早めにご連絡ください。
- ・照射部位は掻いたりしないでください。皮膚を傷つけることで色素沈着になる可能性があります。
- ・治療当日はシャワー程度にして入浴は避けてください。医師またはスタッフの指示に従ってください。
- ・痒みが強い場合は来院してください。

- ・照射後は肌が乾燥しますので十分な保湿でのスキンケアをおこなってください。
香料の強い化粧水のように刺激の強いものは避けてください。
- ・レーザー治療を継続している間の日焼けは禁止です。外出時は必ず日焼け止めを使用してください。

●合併症について

【熱傷】

治療中に軽い火傷を起こす可能性があります。日焼けされた場合に照射してしまうと熱傷のリスクが高くなります。

【その他】

痂皮形成、色素沈着、色素脱失、瘢痕形成、紫斑、紅斑、浮腫、掻痒感、毛孔一致性の炎症

以上

西暦 年 月 日

担当医

私は、上記の内容を理解し、レーザー治療を受けることに同意致します。

西暦 年 月 日

氏名

保護者名

(続柄

)